

Report della settimana dal 23 Luglio al 29 Luglio

← Settimana precedente

AR FI GR LI LU MS PI PO PT SI



Regione Toscana

REGIONE TOSCANA

Servizio fitosanitario

Agroambiente.info

Provincia di Arezzo - Bollettino Olivo Integrato del 2026-07-23

Fenologia



L'indurimento del nocciolo nell'oliva procede ed in alcuni areali è ormai concluso.

Tra il 21 e il 22 si sono verificate diffuse piogge che hanno interessato maggiormente le aree settentrionali e dell'estremo sud della regione con cumulati intorno ai 10 mm e solo localmente hanno raggiunto i 20-25 mm. In qualche caso i fenomeni temporaleschi sono stati associati a grandine.

Occhio di pavone



Occhio di pavone e cercospora

Sono molti i casi di oliveti rilevati con diffusi sintomi di cercospora.

Gli eventuali trattamenti con rameici utilizzati per l'effetto collaterale contro la mosca possono essere preferibili negli oliveti dove la presenza dei due patogeni è molto alta.

Mosca delle olive



Con il passaggio temporalesco del 20-21 le temperature si sono portate su valori inferiori ai giorni precedenti comportando una possibile riduzione della mortalità delle uova e delle larve, situazione che dovrebbe mantenersi anche nei prossimi giorni senza oltrepassare la soglia dei 35°C. Le previsioni indicano per domenica lunedì la possibilità (da confermare) di una perturbazione che dovrebbe portare piogge e valori termici inferiori ai 30 gradi; con l'inizio della settimana si dovrebbe ristabilire una condizione di tempo stabile con temperature in linea con le medie storiche per alcuni giorni.

Di base queste condizioni portano ad un aumento del rischio di infestazione della mosca come ci viene anche confermato dal modello previsionale AI.

Situazione provinciale

Nelle aree olivicole i valori di mortalità teorica cumulata negli ultimi sette giorni sono stati piuttosto elevati, ma il cambio di rotta, se duraturo, li porterà inevitabilmente a ridursi, sarà quindi fondamentale seguire l'evoluzione della situazione.

I dati del monitoraggio evidenziano assenza di infestazione su tutto il territorio provinciale, solo a Cortona in loc. Ossaia è rilevata la presenza molto bassa, 1%.

Lo scostamento della media provinciale rispetto alla settimana scorsa è leggermente positivo, ma resta nettamente negativo rispetto alla settimana 30 del 2025 e alle medie del periodo 2012-2025.

Prestare attenzione all'evoluzione della prossima settimana

Consigli difesa

Strategie attract and kill

Per chi ha scelto strategie attract and kill con cattura massale, nelle aree dove è rilevata infestazione verificare con campionamenti periodici la tenuta del sistema.

Chi ha optato per prodotti con esche attrattive avvelenate effettuare la prima distribuzione, se non già fatto in seguito alla rilevazione dell'aumento dei voli.

Strategie repellenti/antideponenti

Nelle aree dove è segnalata infestazione, verificare la tenuta del sistema scelto con campionamenti delle olive.

Verificare lo stato della copertura dove le eventuali piogge sono state più consistenti.

Chi non avesse ancora provveduto effettuare il trattamento con caolino o prodotti rameici,

L'abbinamento con prodotti adesivanti può prolungare la copertura della vegetazione in caso di piogge.

Strategie in abbinamento

Le **strategie preventive** sono una concreta possibilità **anche per le aziende in integrato**, per poter ridurre l'ovodeposizione e mantenere la possibilità di uso di prodotti ovo-larvicida nel caso in cui i campionamenti delle olive evidenziassero la necessità per la gravità dell'attacco.

Strategie ovarlarvicida

Dai dati rilevati nel monitoraggio di agroambiente non sono al momento necessari trattamenti.

Dove è segnalata ovodeposizione effettuare campionamenti aziendali e se dovesse essere rilevata una infestazione superiore alla soglia di u+l1v del 5-10% effettuare un trattamento con prodotti a base di acetamiprid o flupiradifurone.

Seguire l'evoluzione del meteo e i bollettini nelle prossime settimane.

NB nel portale è stato inserito un **nuovo parametro di infestazione** per sfruttare al meglio l'efficacia dei prodotti disponibili in integrato su uova e larve di prima età, è indicato con "u+l1v". Il parametro non considera le larve di seconda età come l'infestazione attiva usata in passato, che resta un riferimento valido per capire l'attività dell'insetto e sarà ancora utilizzato per le elaborazioni generali.

Note



In conformità al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, alla ripresa dei trattamenti accertarsi il corretto funzionamento delle attrezzature, rimuovere perdite e malfunzionamenti per poter tarare correttamente la distribuzione dei vari prodotti limitando le perdite.

Una difesa efficace passa anche da attrezzature ben mantenute e correttamente tarate.

Provincia di Arezzo - Bollettino Olivo Biologico del 2026-07-23

Fenologia



L'indurimento del nocciolo nell'oliva procede ed in alcuni areali è ormai concluso.

Tra il 21 e il 22 si sono verificate diffuse piogge che hanno interessato maggiormente le aree settentrionali e dell'estremo sud della regione con cumulati intorno ai 10 mm e solo localmente hanno raggiunto i 20-25 mm. In qualche caso i fenomeni temporaleschi sono stati associati a grandine.

Occhio di pavone



Occhio di pavone e cercospora

Sono molti i casi di oliveti rilevati con diffusi sintomi di cercospora.

Gli eventuali trattamenti con rameici utilizzati per l'effetto collaterale contro la mosca possono essere preferibili negli oliveti dove la presenza dei due patogeni è molto alta.

Mosca delle olive



Con il passaggio temporalesco del 20-21 le temperature si sono portate su valori inferiori ai giorni precedenti comportando una possibile riduzione della mortalità delle uova e delle larve, situazione che dovrebbe mantenersi anche nei prossimi giorni senza oltrepassare la soglia dei 35°C. Le previsioni indicano per domenica lunedì la possibilità (da confermare) di una perturbazione che dovrebbe portare piogge e valori termici inferiori ai 30 grandi; con l'inizio della settimana si dovrebbe ristabilire una condizione di tempo stabile con temperature in linea con le medie storiche per alcuni giorni.

Di base queste condizioni portano ad un aumento del rischio di infestazione della mosca come ci viene anche confermato dal modello previsionale AI.

Situazione provinciale

Nelle aree olivicole i valori di mortalità teorica cumulata negli ultimi sette giorni sono stati piuttosto elevati, ma il cambio di rotta, se duraturo, li porterà inevitabilmente a ridursi, sarà quindi fondamentale seguire l'evoluzione della situazione.

I dati del monitoraggio evidenziano assenza di infestazione su tutto il territorio provinciale, solo a Cortona in loc. Ossaia è rilevata la presenza molto bassa, 1%.

Lo scostamento della media provinciale rispetto alla settimana scorsa è leggermente positivo, ma resta nettamente negativo rispetto alla settimana 30 del 2025 e alle medie del periodo 2012-2025.

Prestare attenzione all'evoluzione della prossima settimana

Consigli difesa

Strategie attract and kill

Per chi ha scelto strategie attract and kill con cattura massale, nelle aree dove è rilevata infestazione verificare con campionamenti periodici la tenuta del sistema.

Chi ha optato per prodotti con esche attrattive avvelenate effettuare la prima distribuzione, se non già fatto in seguito alla rilevazione dell'aumento dei voli.

Strategie repellenti/antideponenti

Nelle aree dove è segnalata infestazione, verificare la tenuta del sistema scelto con campionamenti delle olive.

Verificare lo stato della copertura dove le eventuali piogge sono state più consistenti.

Chi non avesse ancora provveduto effettuare il trattamento con caolino o prodotti rameici,

L'abbinamento con prodotti adesivanti può prolungare la copertura della vegetazione in caso di piogge.

Seguire l'evoluzione del meteo e i bollettini nelle prossime settimane.

NB nel portale è stato inserito un **nuovo parametro di infestazione** per sfruttare al meglio l'efficacia dei prodotti disponibili in integrato su uova e larve di prima età, è indicato con "u+l1v". Il parametro non considera le larve di seconda età come l'infestazione attiva usata in passato, che resta un riferimento valido per capire l'attività dell'insetto e sarà ancora utilizzato per le elaborazioni generali.

Note



In conformità al Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, alla ripresa dei trattamenti accertarsi il corretto funzionamento delle attrezzature, rimuovere perdite e malfunzionamenti per poter tarare correttamente la distribuzione dei vari prodotti limitando le perdite.

Una difesa efficace passa anche da attrezzature ben mantenute e correttamente tarate.