

Esempi di alcuni biocidi e PMC da utilizzare contro il virus della Peste Suina Africana

Principio Attivo	Uso consigliato
Complesso potassio perossimonosolfato + acido malico + acido sulfamico + dodecilbensensulfonato + sodio esametafosfato 1%	Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti
Idrossido di Sodio 2%	Aspersione animali abbattuti, stalle e trattamento delle deiezioni (15 lt/m ³ , pH 10,4 -12)
Carbonato di sodio (pH 11,6 - 95 °C) 40%	Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili
Ortofenilfenolo 1%	Irrorazione strutture interne e nebulizzazione ambienti
Ipoclorito di sodio (candeggina) all'1%	Disinfezione di calzature, ruote e attrezzatura usata in attività in ZR 2 e ZR3 per i civili
Dialdeide glutarica+ benzalconio cloruro (1%)	Irrorazione strutture interne ed esterne, ambienti ed attrezzature e mezzi di trasporto
Sali Quaternari d'Ammonio (5%)	Irrorazione strutture interne ed esterne, oggetti ed utensili
Idrato di calce 3%	Aspersione pavimenti
Cresolo 6%	Aspersione pavimenti
Cloro attivo 22,8 – 25,2% diluito al 0,5% (5 g/l)	Attrezzature in genere, calzature del personale, strutture
Ammonio poliquaternario V generazione in associazione a glutaraldeide	Superfici, stivali e calzature professionali, automezzi e attrezzature. Disinfezione di volume

Rispettare scrupolosamente le indicazioni presenti sulla Scheda Tecnica del prodotto (Technical Data Sheet - TDS) .

Per una corretta disinfezione è necessario:

- rimuovere lo sporco grossolano,
- procedere al lavaggio della superficie con acqua e detergente e, una volta asciutto,
- procedere alla disinfezione rispettando le indicazioni del produttore riguardo quantità, diluizioni e tempi di contatto.

La presente tabella ha scopo puramente illustrativo e non include la totalità dei prodotti disponibili.